

Intervention ATVV : Tableau des Résultats

Auteur, année, pays, type, score PEDro, note de qualité	Taille de l'échantillon	Intervention	Résultats et signification : (+) significatif (-) non significatif
<p>Nelson et al., 2000</p> <p>États-Unis</p> <p>ECR</p> <p>4/10</p> <p>Qualité passable</p>	<p>N = 37 prématurés</p> <p>Âge au moment de l'inscription : 33 semaines</p> <p>Diagnostic de la PC : 10/18 (55%)</p> <p>Type de la PC : S. O.</p> <p>Niveau GMFCS : S. O.</p>	<p>Intervention auditive-tactile-visuelle-vestibulaire + soins habituels (ATVV)</p> <p>(n=21)</p> <p>Par rapport aux :</p> <p>Soins habituels (n=16)</p> <p><u>Détails de l'intervention :</u></p> <p><i>Intervention auditive-tactile-visuelle-vestibulaire :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 minutes, 2x/jour, 5x/semaine • L'intervention a commencé à l'hôpital à 33 semaines et s'est poursuivie à domicile après la décharge jusqu'à l'âge rectifié de 2 mois. <p>Stimuli multisensoriels :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuli auditifs par une voix humaine féminine • Stimuli tactiles sous forme de pressions légères • Stimuli visuels par contact visuel • Stimulation vestibulaire par bercement rythmique. 	<p>Après le traitement (2 mois) :</p> <p><i>Interaction mère-nourrisson :</i></p> <p>(-) Code de mutualité dyadique (Dyadic Mutuality Code)</p> <p>(-) Nursing Child Assessment Feeding Scale (NCAFS) : Maternal behaviors (MB) - Sensibilité aux stimuli</p> <p>(-) NCAFS : MB - Réponse à la détresse</p> <p>(+) *NCAFS : MB - Stimulation des compétences sociales et émotionnelles</p> <p>(+) *NCAFS : MB - Stimulation du développement cognitif</p> <p>(-) NCAFS : Comportements des nourrissons (Infant behaviors : IB) - Clarté des indices</p> <p>(+) *NCAFS : IB - Réactivité du nourrisson</p> <p>(+) *NCAFS : Résultats généraux (Summary scores : SS) - Échelle de comportement maternel</p> <p>(-) NCAFS : SS - Échelle de comportement du nourrisson</p> <p>(-) NCAFS : SS - Échelle totale de comportement</p> <p>Lors du suivi (à l'âge de 4 mois) :</p> <p><i>Interaction mère-nourrisson :</i></p> <p>(-) Code de mutualité dyadique (Dyadic Mutuality Code)</p> <p>(-) NCAFS : Maternal behaviors (MB) - Sensibilité aux stimuli</p> <p>(-) NCAFS : MB - Réponse à la détresse</p>

Intervention ATVV : Tableau des Résultats

Auteur, année, pays, type, score PEDro, note de qualité	Taille de l'échantillon	Intervention	Résultats et signification : (+) significatif (-) non significatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Les séances de stimulation ont commencé par 10 minutes de massage léger, suivies de 5 minutes de bercement. Pendant les 15 minutes, l'assistant de recherche a parlé au nourrisson et a essayé de maintenir un contact visuel. • La stimulation était continuellement adaptée en fonction du comportement du nourrisson et des indices psychologiques (par exemple, si le nourrisson réagissait négativement à une stimulation, celle-ci était interrompue et la séquence suivante était initiée). • Les nourrissons ont bénéficié de l'intervention d'un assistant de recherche qui a été formé pour évaluer l'intervention. • Les mères ont appris à évaluer l'intervention avant le retour du nourrisson à la maison et ont observé l'application de l'intervention par auto-évaluation. <p><i>Soins habituels :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Programme de réduction du stress : réduction du stress environnemental (diminution du bruit et de la lumière) et facilitation des cycles de sommeil et du développement moteur. • Les parents ont reçu un programme d'intervention de physiothérapie à domicile. Ce programme a été 	<p>(+) *NCAFS : MB – Stimulation des compétences sociales et émotionnelles (-) NCAFS : MB – Stimulation du développement cognitif (-) NCAFS : IB – Clarté des indices (-) NCAFS : IB – Réactivité du nourrisson (-) NCAFS : SS – Échelle de comportement maternel (-) NCAFS : SS – Échelle de comportement du nourrisson (-) NCAFS : SS – Échelle totale de comportement</p> <p>Note : * En faveur des soins habituels par rapport à l'intervention</p> <p>Lors du suivi (à l'âge de 12 mois) :</p> <p><i>Développement du nourrisson :</i></p> <p>(-) Échelle de Bayley du développement de l'enfant (Bayley scales of Infant development : BSID) : Indice de développement mental (-) BSID : Indice de développement psychomoteur</p>

Intervention ATVV : Tableau des Résultats

Auteur, année, pays, type, score PEDro, note de qualité	Taille de l'échantillon	Intervention	Résultats et signification : (+) significatif (-) non significatif
		modifié au fur et à mesure de la maturation de l'enfant.	